

A védőoltással megelőzhető coronavirusos bélgyulladást mutatjuk be

Coronaviruses bélgyulladás:

A coronavirusok okozta bélgyulladás kórokozója a városi kutya populációban nagyon elterjedt.

A betegség legtöbbször 1 éves kor alatt alakul ki, de felnőtt kutyát is megfertőzhet.

Tünetei hasonlóak a parvovírus fertőzéshez, azonban enyhébbek. A kialakuló bélgyulladás ugyan nem mindig vezet elhulláshoz, de a folyamatos hányás, vízszerű hasmenés erősen legyengíti az állatot és súlyos kondícióromlást idéz elő. Ezen felül hajlamosítja a bélcsatornát a parvovírus fertőzés kialakulására és más betegségek iránt is nő a fogékonyság, melyek együttesen viszont már a kutya pusztulását okozhatják.

A betegség kezelése - hasonlóan a parvovírusos bélgyulladás kezeléséhez - gyakran több napos infúziózást igényel.

A kórokozó a fertőzött bélsárral könnyen terjed.

Megelőzés, Kezelés:

A kiskutyákat 6 hetes koruk után kéthetes időközzel kétszer beoltva védekezhetünk a fertőzés ellen. **Védőoltásból** egykomponensű corona-oltást, és coronavírussal is tartalmazó többkomponensű kombinált oltást is választhatunk.

A megbetegedés kezelése a bélgyulladás általános tüneti kezelése: a 3-4 napos infúziós folyadékpótlás általában elengedhetetlen, emellett probiotikumok, hányáscsillapítók, nyálkahártya védelem, vitamin kiegészítés, szükség esetén antibiotikum.

